

XI. SEZNAM AKTUÁLNÍCH REGISTROVANÝCH VETERINÁRNÍCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ PRO LÉČENÍ VČEL

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv					
Název	Léčivá látka	Síla	Jednotky	Léková forma	Ochranná lhůta
Apiguard	Thymolum	25	%	Gel	Med: 0 dní. Nepoužívejte během období snůšky medu.
Apitraz	Amitrazum	500	mg	Proužek do úlu	Med: Bez ochranných lhůt. Nepoužívejte během snůšky. Nevytácejte med v průběhu 6 týdnů, kdy probíhá ošetření.
Formidol	Acidum formicum	41	g	Proužek do úlu	Med: Bez ochranných lhůt. Veterinární léčivý přípravek je třeba použít v období mimo snůšku a mimo dobu kdy je ve včelstvu konzumní med určený pro lidskou spotřebu.
Formidol 81 g proužky do úlu	Acidum formicum	81	g	Proužek do úlu	Med: Bez ochranných lhůt. Veterinární léčivý přípravek je možno použít pouze v období mimo snůšku a mimo dobu, kdy je ve včelstvu konzumní med.
Gabon PF	Fluvalinatum	90	mg	Proužek do úlu	Med: Bez ochranných lhůt. Veterinární léčivý přípravek je možno použít pouze v době mimo snůšku a mimo dobu, kdy je ve včelstvu konzumní med.
M-1 AER	Fluvalinatum	240	mg/ml	koncentrát pro roztok k léčebnému ošetření včel	Med – bez ochranných lhůt.

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

Název	Léčivá látka	Síla	Jednotky	Léková forma	Ochranná lhůta
MP 10 FUM	Fluvalinatum	24	mg/ml	fumigantní roztok do úlu	Med – bez ochranných lhůt.
Oxuvor	Acidum oxalicum	41	mg/ml	Koncentrát pro přípravu kožního roztoku	Med: Bez ochranných lhůt pro správně ošetřená včelstva. Podání léčiva pouze do úlů bez nasazených medníků.
PolyVar Yellow	Flumethrinum	275	mg	Proužek do úlu	Med: Bez ochranných lhůt. Nepoužívejte v období snůšky medu.
Thymovar, 15 g proužky do úlu pro včely	Proužek do úlu	15.0	g	Proužek do úlu	Med: Bez ochranných lhůt. Nepoužívejte před a během období snůšky. Pláсты v plodišti, které byly během léčby přípravkem THYMOVAR přítomny v úlu, se nesmí stáčet v průběhu následujícího jara.
Varidol	Amitrazum			Roztok k léčebnému ošetření včel	Med: Bez ochranných lhůt. Veterinární léčivý přípravek je možno použít pouze v období mimo snůšku a mimo dobu, kdy je ve včelstvu med určený pro lidský konzum.
VarroMed	Acidum formicum, Acidum oxalicum dihydricum	5 mg/ml + 44	mg/ml	Disperze do úlu	Med: Bez ochranných lhůt.
VarroMed	Acidum formicum, Acidum oxalicum dihydricum	75 mg/ml + 660	mg/ml	Disperze do úlu	Med: Bez ochranných lhůt.